

**INSTRUCCIONES DE USO**  
**ZINBRYTA™**  
**(daclizumab)**  
**inyección, para uso subcutáneo**


Lea estas Instrucciones de uso antes de comenzar a usar ZINBRYTA y cada vez que reponga el medicamento, ya que podría incluir información nueva. Esta información no reemplaza la consulta con su proveedor de atención médica sobre su condición médica o su tratamiento.

**Información importante:**

- **Antes de usar ZINBRYTA por primera vez**, su proveedor de atención médica debe mostrarle a usted o su cuidador cómo preparar e inyectar la jeringa precargada de ZINBRYTA de la forma adecuada.
- ZINBRYTA es para usar exclusivamente bajo la piel (subcutáneo).
- **La jeringa precargada de ZINBRYTA es para un solo uso. No** comparta su jeringa precargada de ZINBRYTA con otras personas. Puede provocarles una infección o contraer una infección de ellas.
- Deseche (descarte) la jeringa precargada de ZINBRYTA inmediatamente después de usarla. Consulte “**Cómo desechar jeringas precargadas de ZINBRYTA usadas**” al final de estas Instrucciones de uso.

**Materiales necesarios para la inyección de su jeringa precargada de ZINBRYTA (consulte la Figura A):**

- una jeringa precargada de ZINBRYTA de 150 mg




**Materiales adicionales que necesitará para la inyección (consulte la Figura B):**

- toallita con alcohol
- apósito de gasa
- banda adhesiva
- 1 recipiente para objetos cortopunzantes para desechar las jeringas precargadas de ZINBRYTA. Consulte “**Cómo desechar jeringas precargadas de ZINBRYTA usadas**” al final de estas instrucciones.
- un área bien iluminada y una superficie limpia y plana para trabajar, como una mesa



## Partes de su jeringa precargada de ZINBRYTA (consulte la Figura C):



- **Antes de preparar la inyección, saque la jeringa preparada de ZINBRYTA del refrigerador y deje que alcance temperatura ambiente durante al menos 30 minutos.**
  - **No** use fuentes de calor externo, como agua caliente, para entibiar la jeringa precargada de ZINBRYTA.
- **No** se inyecte más de una dosis al mes.
  - Si olvida aplicarse una dosis, inyéctese la dosis que no se aplicó lo antes posible, pero con no más de 2 semanas de atraso, e inyéctese la siguiente dosis según lo programado. Si olvida aplicarse una dosis y han pasado más de 2 semanas, sáltese la dosis e inyéctese la siguiente dosis según lo programado.
- Las alas de sujeción le permitirán sostener la jeringa precargada con más firmeza. **No** retire las alas de sujeción.


### Preparación para su inyección:

#### Paso 1: Reúna los materiales y lávese las manos

- Busque un área bien iluminada y una superficie limpia y plana para trabajar, como una mesa, y reúna todos los materiales que necesitará para inyectarse usted mismo o para que otra persona lo inyecte.
- Lávese las manos con jabón y agua y séqueselas bien.

## Paso 2: Revise su jeringa precargada de ZINBRYTA

- Revise la fecha de vencimiento impresa en la jeringa precargada de ZINBRYTA (**consulte la Figura D**).
  - **No** use una jeringa precargada de ZINBRYTA después de la fecha de expiración.
- Revise que su medicamento de ZINBRYTA sea transparente e incoloro a ligeramente amarillo (**consulte la Figura E**).
  - **No** use la jeringa precargada de ZINBRYTA si el líquido tiene aspecto turbio o hay partículas flotando en él.
  - Podría ver burbujas de aire en su medicamento de ZINBRYTA. Esto es normal y no afectará la dosis.



## Administrar la inyección:

### Paso 3: Elija y limpie el lugar de la inyección

- La jeringa precargada de ZINBRYTA es para usar exclusivamente bajo la piel (subcutánea).
- La jeringa precargada de ZINBRYTA debe inyectarse en el muslo, estómago (abdomen) o la cara posterior de la parte superior del brazo (**consulte la Figura F**).
  - **No** la inyecte directamente en el ombligo.
  - **No** la inyecte en un área del cuerpo donde la piel esté irritada, sensible, enrojecida, amoratada, infectada, con cicatrices o tatuada.
- Elija el lugar de la inyección y limpie la piel con una toallita con alcohol.
- Deje que el lugar de la inyección se seque antes de inyectar la dosis.
  - **No** vuelva a tocar esta área antes de administrar la inyección.
- No retire la cubierta de la aguja de la jeringa precargada de ZINBRYTA hasta que usted esté listo para la inyección.



Figura F

#### Paso 4: Retire la cubierta de la aguja de la jeringa precargada de ZINBRYTA

- Con una mano, sostenga la jeringa precargada de ZINBRYTA tal como se muestra. **No** presione sobre las alas de sujeción. Con la otra mano, sostenga firmemente la cubierta de la aguja y tire directamente de la cubierta (**consulte la Figura G**).
  - Deseche la cubierta de la aguja después de la inyección. **No** vuelva a tapar la jeringa precargada de ZINBRYTA, podría pincharse con la aguja.
  - **No** toque la aguja.



Figura G

#### Paso 5: Inyéctese la jeringa precargada de ZINBRYTA

- Consulte el Paso 3 para saber cuáles son los lugares apropiados para aplicar la inyección.
- Con una mano, use el pulgar y el dedo índice y pellizque la piel alrededor del lugar de la inyección limpio (**consulte la Figura H**).



Figura H

- Con la otra mano, sostenga la jeringa precargada de ZINBRYTA como un lápiz. **Use un movimiento rápido similar a lanzar un dardo e inserte la aguja en un ángulo de 90° en la piel (consulte la Figura I).**
- Después de insertar la aguja, suelte la piel



Figura I

- Lentamente empuje el émbolo hacia abajo hasta que la jeringa esté vacía (**consulte la Figura J**).
  - **No** hale el émbolo hacia atrás.
  - **No** saque la jeringa precargada de ZINBRYTA de la piel hasta que haya empujado lentamente el émbolo completamente hacia abajo.



Figura J

**Paso 6: Retire la jeringa precargada de ZINBRYTA del lugar de la inyección**

- Saque la aguja de la piel en forma recta (**consulte la Figura K**).
  - Si ve sangre en el lugar de la inyección, límpiela con la gasa y aplique una banda adhesiva.
- **No** vuelva a tapar la jeringa precargada de ZINBRYTA. Volver a tapar la jeringa precargada puede provocar un pinchazo con la aguja.
- **No** vuelva a utilizar la jeringa precargada de ZINBRYTA.



Figura K

**Después de la inyección:**

**Paso 7: Cómo desechar jeringas precargadas de ZINBRYTA usadas**

- Coloque las jeringas precargadas de ZINBRYTA usadas en un recipiente para objetos cortopunzantes aprobado por la FDA inmediatamente después de usarlas. **No deseche (descarte) agujas sueltas y jeringas precargadas de ZINBRYTA en la basura común.**
- Si no tiene un recipiente para objetos cortopunzantes aprobado por la FDA, puede usar un recipiente doméstico que:
  - esté hecho de plástico grueso,
  - se pueda cerrar con una tapa ajustada resistente a las perforaciones, sin que los objetos cortopunzantes puedan salirse,
  - se mantenga erguido de forma vertical y estable durante el uso,
  - sea resistente a los derrames y
  - esté correctamente etiquetado para advertir de los residuos peligrosos dentro del recipiente.

- Cuando el recipiente de objetos cortopunzantes esté casi lleno, deberá seguir las pautas de su comunidad para la forma adecuada de desechar dicho recipiente. Pueden existir leyes estatales o locales acerca de cómo debe desechar las agujas y jeringas usadas. Para obtener más información acerca de cómo desechar de manera segura los objetos cortopunzantes y para información específica acerca de cómo desechar objetos cortopunzantes en el estado en el que vive, visite el sitio web de la FDA en: <http://www.fda.gov/safesharpsdisposal>.
- **No** deseche su recipiente de objetos cortopunzantes en la basura común a menos que las pautas de su comunidad lo permitan. **No** recicle su recipiente usado de objetos cortopunzantes.

### ¿Cómo debo almacenar ZINBRYTA?

- Guarde ZINBRYTA en el refrigerador a una temperatura entre 36 °F y 46 °F (entre 2 °C y 8 °C).
- **No** congele ZINBRYTA ni lo exponga a temperaturas sobre los 86 °F (30 °C). **No** use ZINBRYTA si se ha congelado.
- Mantenga ZINBRYTA en la caja original para protegerlo de la luz.
- Si no puede refrigerar ZINBRYTA, puede almacenar ZINBRYTA a temperatura ambiente por hasta 30 días.
- Si ZINBRYTA alcanzó temperatura ambiente, **no** lo vuelva a refrigerar.
- **Mantenga ZINBRYTA y todos los medicamentos lejos del alcance de los niños.**

### ¿Tiene preguntas?

Para preguntas relacionadas con el producto o servicio, llame al 1-800-456-2255 o visite [www.Zinbryta.com](http://www.Zinbryta.com).

La Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. ha aprobado estas Instrucciones de uso.

Fabricado por: Biogen Inc., Cambridge, MA 02142

©2013-2016 Biogen. Todos los derechos reservados. 1-800-456-2255

Publicación: 05/2016